


Звезды

Сергей Попов
(ГАИШ МГУ)


Звездные параллаксы

Звезды – далекие Солнца?

В течение веков некоторые ученые так думали, но были и серьезные основания для сомнений. Необходимо было обнаружить простой эффект.



Right eye open




Left eye open



Тихо Браге


Если мы смотрим на некий предмет то одним, то другим глазом, то он сдвигается на фоне более далеких.

Так можно измерять расстояние до довольно далеких объектов.



Параллактический сдвиг из-за движения Земли вокруг Солнца.

Параллакс



Угол мал! Поэтому $\tan(\text{параллакс}) \approx \sin(\text{параллакс}) \approx \text{параллакс} [\text{рад}]$

Расстояние = $1 \text{ а.е.} / \text{параллакс} [\text{рад}]$

Расстояние [пк] = $1 / \text{параллакс} [\text{угл.сек.}]$

Парсек – расстояние, соответствующее параллаксу одна угловая секунда
Парсек равен 206265 (число секунд в радиане) астрономических единиц.

$1 \text{ пк} = 3.1 \cdot 10^{18} \text{ см}$

Первые измерения параллаксов



В.Я. Струве.
Вега. 1837 г.




Ф. Бессель.
61 Лебедя 1838 г.



Томас Хендерсон
Альфа Центавра 1833


Измерения расстояний до звезд

Впервые надежно был задан масштаб межзвездных расстояний. Это дало основу для более уверенных рассуждений и о звездах, и о структуре Галактики.




Пределы точного измерения расстояний


Sol




Hipparcos (1990)



Gaia (2020)



Первый релиз данных Gaia



Второй релиз Gaia

→ HOW MANY STARS WILL THERE BE IN THE SECOND GAIA DATA RELEASE?



position & brightness on the sky

1 692 919 135

surface temperature

161 497 595

red colour

1 383 551 713

blue colour

1 381 964 755

parallax and proper motion

1 331 909 727

radius & luminosity

76 956 778

amount of dust along
the line of sight

87 733 672

14 099


Solar System
objects

550 737

variable sources

radial velocity


7 224 631



Апрель 2018 г.

Детали в [arxiv:1804.09365](https://arxiv.org/abs/1804.09365)

Следующий релиз — конец 2020 г.
Окончательный — 2022 г.




Объем человека < 100 литров
Объем ядер атомов $< 10^{-11}$ литров

$> 99.9\%$
массы

Размер ядра $\sim 10^{-14}$ м

Размер атома $\sim 10^{-10}$ м






$V_{\text{звёзд}} < 10^{-30} V_{\text{вселенная}}$

Галактики и звёзды




Свет звёзд



Мы видим мир, потому что есть свет звёзд

Парадокс Ольберса




Значит, звёзды где-то «заканчиваются».

Мы смотрим в прошлое

Звёзды когда-то возникли

Образование звёзд



Мы видим звёзды разных возрастов.
В том числе и молодые и только-только
образующиеся на наших глазах.

Масса Джинса


$$2K + U = 0 \left\{ \begin{array}{l} K = (N) \left(\frac{3}{2} kT \right) \\ U = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R} \end{array} \right. \Rightarrow 2NkT = \frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$$

$$M_J = \left(\frac{5kT}{Gm} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho} \right)^{1/2}$$

if $M_{\text{cloud}} > M_J \rightarrow \text{collapse!}$

$$R_J \simeq \left(\frac{15kT}{4\pi G \mu m_H \rho_0} \right)^{1/2}$$

Первые звёзды



Звёзды образуются раньше галактик


История вселенной

В начале вселенная была горячей. В течение сотен тысяч лет это были ионизованные водород и гелий.



Спустя примерно 370 000 лет после начала расширения вещество рекомбинировало – стало нейтральным.

Наступили «темные времена».

Постепенно начали появляться первые звезды и квазары. Возникали галактики.




Моделирование первых звезд




1407.1374


Часто в минигало
образуется более
чем одна звезда.
Поэтому звезды
могут быть не только
очень массивными.




Спектр масс первых звезд



1407.1374



Очень малометаллическая звезда




Самое низкое отношение C/H
Самая низкая металличность.

Если предел понизить еще в два раза,
то возникнут проблемы у моделей
образования самых первых звезд,
т.к. сейчас они говорят, что
маломассивные звезды не могли
образовываться из первичного вещества.

Наблюдения велись на VLT в Чили.

Устойчивость звезды

Hydrostatic Equilibrium



Сила тяжести уравновешена градиентом давления.

Для приближенных оценок
можно использовать
 $P/\rho \approx GM/R^2$

$$\rho \frac{d^2 r}{dt^2} = -G \frac{M_r \rho}{r^2} - \frac{dP}{dr}$$

Diagram illustrating the forces acting on a spherical shell of a star, showing the balance between gravity and pressure gradient.

Labels in the diagram:


- DENSITY** (points to ρ)
- MASS WITHIN A SPHERE OF RADIUS r** (points to M_r)
- ACCELERATION** (points to $\frac{d^2 r}{dt^2}$)
- GRAVITATIONAL CONSTANT** (points to G)
- PRESSURE GRADIENT** (points to $\frac{dP}{dr}$)

«Отрицательная теплоемкость»

Для звезды можно записать теорему вириала.


Отвод тепловой энергии приводит к сжатию звезды (например, из-за падения темпа выделения энергии), что влечет за собой ее нагрев.

Наоборот, подвод избыточной энергии (например, из-за роста энерговыделения в ядре) приводит к расширению и остыванию.



(рис. В. Липунова)

Эволюция



Эволюция звёзд




Популяция III – самые первые звёзды

Популяция II – старые звёзды в Галактике

Популяция I – «современные» звёзды (Солнце)

Меняется состав звёзд, меняются звёзды,
меняется их судьба

Диаграмма Герцшпрунга -Рассела



Самые легкие звезды имеют массу 0.08 солнечных.



Самые тяжелые из образующихся сейчас около 100-200.

С ростом массы резко растет светимость.

Время жизни тем больше, чем меньше масса звезды.

Эволюция одиночной звезды


Эволюция звезды — это смена источников горения




Масса – главный параметр

Судьба звезды зависит от ее массы.

- Чем массивнее звезда – тем больше она излучает и меньше живет
- Массивные звезды в конце жизни взрываются, а их ядра становятся нейтрон. звездами или черными дырами
- Маломассивные звезды сбрасывают оболочки, и их ядра становятся белыми карликами




Соотношение масса-светимость



Для легких звезд
(пока давление газовое)
 $L \sim M^{3-4}$

Для тяжелых звезд
(когда давление излучения
становится важнее)
 $L \sim M$

Горение водорода в звездах и альтернативные теории гравитации




Автор статьи 1510.05964 показывает, что известный предел на минимальную массу звезд (т.е. на начало термоядерных реакций) позволяет дать важные ограничения на альтернативные модели гравитации.

Оказывается, что этот предел весьма чувствителен к параметрам модели. Настолько, что позволяет закрыть некоторый важный диапазон параметров.


Т.о., если скалярно-тензорные теории и верны, то параметры должны быть таковы, что известные эффекты (здесь речь идет о космологической постоянной, кривых вращения галактик и т.д.) нельзя будет объяснить альтернативной гравитацией.

Соотношение масса-радиус

Соотношение зависит от параметров конвективной оболочки.





Для масс < 1 солнечной показатель степени равен примерно 0.8-1. А для больших масс примерно – 0.6.




Эволюция на диаграмме Г-Р

Дольше всего звезды находятся на главной последовательности.



Время жизни звезды




$T \sim M/L$

Для маломассивных $T \sim M^{-2}$,

для массивных выходит на константу.

Область неустойчивости



В ходе своей эволюции массивные звезды попадают в область, где они становятся неустойчивыми. Начинаются пульсации.

Известным классом пульсирующих звезд являются цефеиды.


Они характерны тем, что у них светимость коррелирует с периодом пульсаций.

Это позволяет использовать их для измерения расстояний.

$$\text{Период} \sim (G\rho)^{-1/2}$$


Зависимость период-светимость

Благодаря спутнику Gaia удастся точно определить расстояния до многих цефеид и звезд типа RR Лиры. Это важно и для определения расстояний на межгалактических масштабах.



Химическая эволюция и звезды

В течение своей жизни и по ее окончании звезды сбрасывают часть своего вещества, обогащенного синтезированными элементами, в межзвездное пространство. Так в наши дни изменяется химический состав вселенной.



Возникновение элементов во Вселенной

Большинство химических элементов, с которыми мы сталкиваемся в жизни (и из которых состоим), возникли в звездах в течение их жизни в результате термоядерных реакций, или на последних стадиях жизни массивных звезд – во взрывах сверхновых.

До образования звезд обычное вещество в основном существовало в виде водорода (самый распространенный элемент) и гелия.

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra																
			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
			Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Big Bang

Supernovae

Large Stars

Small Stars

Cosmic Rays

S-процесс




Этот процесс дает свободные нейтроны, которые легко проникают в ядра.

Идет в оболочках звезд-гигантов.


Медленный захват нейтронов.
Идет при относительно низкой плотности нейтронов.

Захваченный нейтрон испытывает в ядре бета-распад, превращаясь в протон.



Синтез элементов с массой до сотни и примерно от 138 до 208

R-процесс




Идет во вспышках сверхновых и при слиянии нейтронных звезд.


Важен для тяжелых элементов вплоть до урана.

Протекает при очень высокой плотности нейтронов. Например, при нейтронизации вещества в сверхновых.

Возникают насыщенные нейтронами ядра.



r- and *s*-process synthesis paths



Мафусаил: очень старая звезда в солнечной окрестности

HD 140283
субгигант
из гало Галактики


Расстояние
<200 световых лет

Возраст
>13.4 млрд. лет

Эволюционная стадия
звезды позволяет
довольно точно
оценить ее возраст,
зная светимость



Самая старая звезда,
но «металличность»
все-таки не нулевая,
т.е. это не звезда из
самого первого поколения.






Двойные звезды

Zeta Ursae Majoris (Mizar)




(C) D. Nash


Мицар – пара из
двух двойных



Мицар А



Доля двойных звезд



Примерно половина звезд
входит в двойные и кратные.


Среди массивных —
эта доля выше.

Среди маломассивных — меньше.

Красивые двойные звезды

Есть немало красивых двойных, видимых уже в небольшой телескоп.


Обычно, это звезды с разными цветами.



... или вот такая экзотика, как четверная эпсилон Лир.




Альбиро




Обмен масс в двойной

В двойной системе звезды могут обмениваться веществом, т.е. меняется масса звезд.




Парадокс Алголя




В середине XX века наблюдения показали, что в системе Алголя менее массивная звезда выглядит более проэволюционировавшей.

Объяснить это удалось только с привлечение обмена масс.



Гелиевые белые карлики



Белые карлики образуются из ядер звезд.
Но только достаточно массивные звезды успели проэволюционировать.
Такие звезды дают углеродно-кислородные белые карлики.
Но мы видим и гелиевые.

Как же они образовались?


Сверхновые типа Ia



Существует предельная масса белого карлика


Взрываются не только умирающие массивные звезды.

Если на белый карлик в двойной системе
натечет слишком много вещества,
то произойдет взрыв.



Взрыв белого карлика

Thermonuclear Supernova Explosion



(c) Friedrich Röpke, MPA, 2004

Сверхновая 1987А

Удивительная структура оболочек сверхновой 1987А может быть связана с двойственностью звезды-прародителя.





Реальное изображение




Теоретическая модель

Модель сверхновой 1987А



Изображения двойных звезд


Мира
(омикрон Кита)
в рентгене и оптике:
белый карлик и
красный гигант



Изображ



Интерферометр
CHARA




Самая тесная двойная




HM Cancri

Двойная система из двух белых карликов.
Период системы всего лишь 321 секунда!
Расстояние между звездами: менее 100 тыс. км.
Орбитальная скорость более миллиона км/час!
Массы 0.27 и 0.55 солнечных.
Излучение гравитационных волн .





Новые звезды



Водород, перетекая на белый карлик с обычной звезды, накапливается, пока не начинаются термоядерные реакции.

Nova Light Curve






Планетарные туманности



Формы некоторых планетарных туманностей могут определяться двойственностью центральных звезд.

Биполярная структура может возникать из-за последствий взаимодействия звезд.

Измерение масс



Измеряем:

- период вращения
- скорости звезд

Тогда можем найти
массы, если знаем
наклон орбиты

Непосредственное измерение масс звезд
возможно только в двойных системах.

Функция масс

$$v_2 = \frac{v_1 m_1}{m_2}$$

$$v_1 + v_2 = v_1 \left(1 + \frac{v_2}{v_1} \right)$$

$$v_1 + v_2 = v_1 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right)$$

$$v_1 + v_2 = \frac{v_1}{m_2} (m_1 + m_2)$$

$$m_1 + m_2 = \frac{P (v_1 + v_2)^3}{2\pi G \sin^3 i}$$

$$m_1 + m_2 = \frac{P}{2\pi G \sin^3 i} \left[\frac{v_{1r} (m_1 + m_2)}{m_2} \right]^3$$

$$\frac{P v_{1r}^3}{2\pi G} = \frac{m_2^3 \sin^3 i}{(m_1 + m_2)^2}$$

$$\frac{P v_{1r}^3}{2\pi G} = \frac{m_2^3 (\sin i)^3}{m_2^2 (1+q)^2} \quad \text{где } q = m_1/m_2$$


$$\text{Обозначим } f(m) = \frac{P v_{1r}^3}{2\pi G}$$

Тогда $m_2 = f(m) (1+q)^2 / (\sin i)^3$

Функция масс – нижний предел на m_2





Родные или сводные

Двойная система может образоваться в результате захвата




Планеты в двойных

Уже известны планеты в двойных системах.
Обычно расстояние от звезды до планеты
намного меньше расстояния между звездами




Скорости звезд в Галактике



Однако звезды диска двигаются друг относительно друга с небольшими скоростями: порядка 30 км/с.

Круговые скорости звезд в Галактике довольно велики - >200 км/с. Это позволяет оценить скорость убегания. С учетом гало она оказывается ~ 500 км/с, и зависит от расстояния от центра.



Убегающие звезды



Динамическое взаимодействие



Распад двойной системы

Оба варианта приводят к появлению массивных одиночных звезд со скоростями в 2-3 раза выше, чем в среднем.


Типичные скорости 50-70 км в сек.

Открыты в 1947 г.

Известно много десятков таких объектов.



В окрестности Солнца 10-30% звезд класса О и 5-10% звезд класса В относятся к убегающим.

Материнские скопления убегающих звезд



Можно определить, в каких скоплениях родились убегающие звезды. Также можно найти нейтронные звезды, с которыми связаны убегающие.

Распад двойной системы



Сброс более половины массы
приводит к распаду двойной.
Также система может распасться,
если после взрыва сверхновой
компактный объект получит кик.


Разрушение двойной

M1

Solar masses


19.00

17.88



1.40	NS "E"			9.89	9.09
1.40	NS "E"			9.72	22.46
	NS "E"			SN II	22.46
1.40	NS "E"			NS "E" 1.40	24.70
1.40	NS "E"			NS "P" 1.40	7193.00
1.40	NS "E"			NS "A" 1.40	9775.00
1.40	NS "P"			NS "A" 1.40	11440.00

Самая быстрая в Галактике




US 708
1200 км/с


Летит не из центра Галактики.
Наиболее вероятно,
что она родилась в двойной
системе, разрушенной
взрывом сверхновой.
Причем, сверхновой Ia!

Динамическое взаимодействие

Взаимодействие трех или четырех звезд в скоплении может привести к вылету одной из звезд с большой скоростью.




Типичная «добавка» к скорости – десятки км в сек. Но может быть и намного больше:
 $v_{\max} = (2GM/R)^{1/2}$, где M и R – параметры наиболее массивной звезды, участвующей во взаимодействии.





Взаимодействие с газом среды

Быстродвигающиеся звезды
приводят к образованию
ударных волн




Скорость звука
в МЗС -
10 км в сек






Столкновение ветров

Столкновение звездных ветров от двух массивных звезд, или от звезды и пульсара, приводит к появлению яркого источника жесткого излучения.




Звезды гало




Круговая скорость на орбите Солнца более 200 км в сек.

Но, двигаясь по вытянутым орбитам, звезды гало, пересекая диск, могут иметь скорости даже несколько выше.

В солнечной окрестности звезды гало можно выделить по высокой скорости относительно близких звезд (нас) и по траектории движения.




Свойства звезд гало




- Старые
- Маломассивные
- Малометаллические

Звезды гало имеют высокие скорости относительно Солнца, т.к. движутся по орбитам другого типа и пересекают галактическую плоскость под большими углами.

Самые быстрые звезды




«Включить гиперджеты!»




Гиперскоростные звезды.
Скорости порядка 700 км в сек

Уже гравитационно не связаны с
нашей Галактикой.

Черная дыра как «ускоритель»



Взаимодействие трех тел




Распад двойной в поле дыры


Странные путешественники

Голубая звезда вдали от плоскости Галактики

1 Triple-star system moves near black hole at center of Milky Way galaxy.




2 One star falls toward black hole; binary pair recoils and is ejected.



3 Binary system leaves galaxy.




4 Binary merges to form blue straggler.



5 Blue straggler travels away from galaxy.





Полетим в другую галактику?



23 млн лет назад
звезда пролетела
в 13 кпк от БМО

Эволюция звезд




Солнце эволюционирует. Его возраст менее 5 миллиардов лет. Примерно через 5 миллиардов лет закончится водород в его ядре. Солнце превратится в красного гиганта, а затем - в белый карлик. Массивные звезды в конце жизни взрываются, оставляя нейтронную звезду или черную дыру.




Сверхновые

Жизнь массивной звезды заканчивается колоссальным взрывом – сверхновой. Также взрываться могут белые карлики, если они стали слишком тяжелыми.

На короткое время звезда становится ярче целой галактики!



Ушедшие без шума



Звезда
исчезла
без взрыва
сверхновой.

Есть много
таких
случаев.

Авторы искали и нашли случай, когда массивная звезда исчезла, а никакой сверхновой не было видно. Они используют архивные данные Хаббловского телескопа для поиска исчезнувших (без взрыва) массивных звезд. Исследовано 15 галактик. Выделено несколько кандидатов. Детальный анализ показал, что одно событие действительно очень похоже на исчезновение желтого сверхгиганта (масса около 25-30 масс Солнца) без взрыва. Это примерно то, что и ожидалось, т.е., пусть и на очень низкой статистике, но подтверждает идею о "тихом коллапсе" некоторых массивных звезд. Хотя в статье приведен лишь один хороший кандидат, доля таких событий может быть довольно большой.